

# レジメン概要

レジメン名	Cabazitaxel triweekly
適応症	前立腺癌
診療科	泌尿器科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ジェブタナ	カバジタキセル	CBZ	60mg

## 投与法詳細

1サイクル 21 日

- |   |            |    |
|---|------------|----|
| ① 生食100mL   | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② デキサート6.6mg + 生食50mL                                     |            | d1 |
| ③ ザンタック50mg   | ワンショット     | d1 |
| ④ グラニセトロン3mg + 生食100mL                                    | 0.5hr      | d1 |
| ⑤ ジェブタナ 25mg/m <sup>2</sup> + 生食250mL (最終濃度0.1~0.26mg/mL) | 1hr        | d1 |
| ⑥ 生食10mL  | フラッシュ      | d1 |
| ⑦ ジーラスタ皮下注3.6mg (ジェブタナ投与24時間後以降)                          |            | d2 |
| ⑧   |            |    |
| ⑨   |            |    |
| ⑩   |            |    |
| ⑪   |            |    |
| ⑫   |            |    |
| ⑬   |            |    |

コメント 投与30分前にレスタミンコーワ(10)5T内服、プレドニゾロン10mg/日連日投与