

レジメン概要

レジメン名	PTX+CBDCA+BEV (卵巣がん)
適応症	卵巣癌
診療科	婦人科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|---|------------|----|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② デキサート19.8mg + 生食50mL | 5min | d1 |
| ③ アロキシ0.75mg + ガスター20mg + 生食100mL | 0.5hr | d1 |
| ④ パクリタキセル175mg/m ² + 生食500mL | 3.0hr | d1 |
| ⑤ カルボプラチン 6AUC + 生食250mL | 1.0hr | d1 |
| ⑥ アバスチン15mg/kg + 生食100mL | 1.5hr | d1 |
| ⑦ ソルデム3A 500mL | 2.0hr | d1 |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール21日。パクリタキセル投与30分前にレスタミンコーワ錠10mg5錠内服。