

レジメン概要

レジメン名	PTX+CDDP+BEV (子宮頸がん)
適応症	子宮頸癌
診療科	婦人科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

①	ソルデム3A 500mL	2.0hr	d1
②	デキサート11.55mg + 生食50mL	5min	d1
③	アロキシ0.75mg + ガスター20mg + 生食100mL	0.5hr	d1
④	パクリタキセル135mg/m ² + 生食500mL	3.0hr	d1
⑤	シスプラチン50mg/m ² + 生食500mL	2.0hr	d1
⑥	ソルデム3A 500mL + ラシックス10mg	2.0hr	d1
⑦	ソルデム3A 500mL + ラシックス10mg	2.0hr	d1
⑧	ソルデム3A 500mL	2.0hr	d1
⑨	ソルデム3A 500mL	2.0hr	d1
⑩	生食100mL	血管確保+フラッシュ	d9
⑪	アバスチン15mg/kg + 生食100mL	1.5hr	d9
⑫			
⑬			

コメント 1クール21日。パクリタキセル投与30分前にレスタミンコーワ錠10mg5錠内服。DPCの関係上BEVはday9以降外来で投与。