

# レジメン概要

レジメン名	ddEC (EPI+CPA)
適応症	乳癌
診療科	乳腺外科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
エピルビシン	エピルビシン	EPI	10mg, 50mg
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500mg

## 投与方法詳細

1サイクル 14 日

- |                                       |            |    |
|---------------------------------------|------------|----|
| ① 生食100mL                             | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② プロイメンド+生食100mL                      | 30分        | d1 |
| ③ アロキシ+デキサート9.9mg+生食100mL             | 30分        | d1 |
| ④ エピルビシン90mg/m <sup>2</sup> +生食50mL   | 5分         | d1 |
| ⑤ エンドキサン600mg/m <sup>2</sup> +生食250mL | 1時間        | d1 |
| ⑥ ジーラスタ                               | 皮下注        | d4 |
| ⑦                                     |            |    |
| ⑧                                     |            |    |
| ⑨                                     |            |    |
| ⑩                                     |            |    |
| ⑪                                     |            |    |
| ⑫                                     |            |    |
| ⑬                                     |            |    |

コメント 4コース実施後ddPTX 投与後24-72時間後にジーラスタ皮下注