

# レジメン概要

レジメン名	Atezolizumab + Bev + PTX + CBDCA
適応症	非小細胞肺癌
診療科	呼吸器内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
テセントリク	アテゾリズマブ	-	1200mg
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |  |             |    |
|--|-------------|----|
| ① 生食50mL                               | 血管確保+フラッシュ  | d1 |
| ② テセントリク1200mg+生食250mL                 | 60分→30分     | d1 |
| ③ グラニセトロン+プロイメンド+デキサート8.25mg+生食100mL   | 30分         | d1 |
| ④ ガスター+生食50mL                          | 15分         | d1 |
| ⑤ パクリタキセル200mg/m <sup>2</sup> +生食500mL | 3時間         | d1 |
| ⑥ カルボプラチンAUC6+5%ブドウ糖250mL              | 1時間         | d1 |
| ⑦ アバスチン15mg/kg+生食100mL                 | 90分→60分→30分 | d1 |
| ⑧                                      |             |    |
| ⑨                                      |             |    |
| ⑩                                      |             |    |
| ⑪                                      |             |    |
| ⑫                                      |             |    |
| ⑬                                      |             |    |

コメント Atezolizumab開始時より心電図モニターを装着 忍容性良好であれば2回目の投与はAtezolizumab30分、Bev60分で可、3回目以降はBev30分で可。4~6サイクル終了後、Atezolizumab+BEVの維持療法（3週ごと）。