

# レジメン概要

レジメン名	CDDP/CBDCA+PEM+Pembrolizumab
適応症	非小細胞肺癌
診療科	呼吸器内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	100mg, 500mg
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	-	20mg, 100mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |  |            |    |
|--|------------|----|
| ① 生食50mL                                       | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② キイトルーダ200mg+生食100mL                          | 30分        | d1 |
| ③ プロイメンド+生食100mL                               | 30分        | d1 |
| ④ グラニセトロン+デキサート3.3mg+生食100mL                   | 30分        | d1 |
| ⑤ アリムタ500mg/m <sup>2</sup> +生食100mL            | 10分        | d1 |
| ⑥ カルボプラチン5AUC+生食250mL                          | 1時間        | d1 |
| ⑦ CDDPの場合：③以降                                  |            |    |
| ⑧ グラニセトロン+プロイメンド+デキサート9.9mg+生食100mL            | 30分        | d1 |
| ⑨ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5%Glu500mL (×2) | 2時間        | d1 |
| ⑩ アリムタ500mg/m <sup>2</sup> +生食100mL            | 10分        | d1 |
| ⑪ シスプラチン75mg/m <sup>2</sup> +生食500mL           | 1時間        | d1 |
| ⑫ 維持療法③以降                                      |            |    |
| ⑬ グラニセトロン+デキサート6.6mg+生食50mL                    | 30分        | d1 |

コメント 

デキサート錠day0,2,3,4に8mg、day5に4mg内服。4サイクル終了後、Pembrolizumab+PEMの維持療法。
--