

# レジメン概要

レジメン名	CBDCA+PTX/nabPTX+Pembrolizumab
適応症	非小細胞肺癌
診療科	呼吸器内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	nab-PTX	100mg
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	-	20mg, 100mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |  |            |         |
|--|------------|---------|
| ① 生食50mL                               | 血管確保+フラッシュ | d1      |
| ② キイトルーダ200mg+生食100mL                  | 30分        | d1      |
| ③ プロイメンド+グラニセトロン+デキサート9.9mg+生食100mL    | 30分        | d1      |
| ④ パクリタキセル200mg/m <sup>2</sup> +生食500mL | 3時間        | d1      |
| ⑤ カルボプラチンAUC6+生食250mL                  | 1時間        | d1      |
| ⑥                                      |            |         |
| ⑦ nabPTXの場合、③以降                        |            |         |
| ⑧ プロイメンド+グラニセトロン+デキサート3.3mg+生食100mL    | 30分        | d1      |
| ⑨ アブラキサン100mg/m <sup>2</sup> +生食       | 30分        | d1,8,15 |
| ⑩                                      |            |         |
| ⑪                                      |            |         |
| ⑫                                      |            |         |
| ⑬                                      |            |         |

コメント 4サイクル終了後、Pembrolizumabの維持療法。