

# レジメン概要

レジメン名	G-CHOP (Obinutuzumab-CHOP)
適応症	非ホジキンリンパ腫（濾胞性リンパ腫）
診療科	血液内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ガザイバ	オビヌツズマブ	-	1000mg
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	10mg, 50mg
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1mg
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

① 生食100mL	血管確保+フラッシュ用	d1,d8,d15
② ポララミン+生食50mL	15分	d1,d8,d15
③ ガザイバ1000mg+生食250mL	コメント参照	d1,d8,d15 (d8,d15)
④ グラニセトロン+生食50m	15分	d1
⑤ ドキシソルビシン50mg/m <sup>2</sup> +生食100mL	30分	d1
⑥ オンコビン1.4mg/m <sup>2</sup> +生食50mL	15分	d1
⑦ エンドキサン750mg/m <sup>2</sup>	2時間	d1

- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬

コメント オブヌツズマブ投与60分から12時間前にPSL100mg内服、30分前にブルフェン2錠内服。強い嘔気が予想される時にはイメンド内服、アロキシ点滴も考慮。C1初回は50mg/時の速度で点滴静注し、患者の状態を観察しながら、30分毎に50mg/時ずつ最大400mg/時まで可、c12回目以降は100mg/時で投与を開始しinfusion reactionが認められない場合、30分毎に100mg/時ずつ最大400mg/時まで可。