

# レジメン概要

|       |                      |
|-------|----------------------|
| レジメン名 | Nivolumab+Ipilimumab |
| 適応症   | 腎細胞癌                 |
| 診療科   | 泌尿器科                 |

| 使用薬   | 一般名    | 略称   | 当院採用規格      |
|-------|--------|------|-------------|
| オブジーボ | ニボルマブ  | Nivo | 100mg, 20mg |
| ヤーボイ  | イピリムマブ | Ipi  | 50mg        |
|       |        |      |             |
|       |        |      |             |

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |                      |            |    |
|----------------------|------------|----|
| ① 生食100mL            | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② オブジーボ240mg+生食100mL | 30分        | d1 |
| ③ 生食100mL            | 30分        | d1 |
| ④ ヤーボイ1mg/kg+生食50mL  | 30分        | d1 |
| ⑤                    |            |    |
| ⑥                    |            |    |
| ⑦                    |            |    |
| ⑧                    |            |    |
| ⑨                    |            |    |
| ⑩                    |            |    |
| ⑪                    |            |    |
| ⑫                    |            |    |
| ⑬                    |            |    |

コメント ヤーボイの最終濃度は1~4mg/mL