

# レジメン概要

レジメン名	G-Benda (1コース目)
適応症	濾胞性リンパ腫
診療科	血液内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ガザイバ	オビヌツズマブ	-	1000mg
トリアキシシ	ベンダムスチン	-	100mg

## 投与方法詳細

1サイクル 28 日

- |   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| ① 生食100mL   | 血管確保+フラッシュ        | d1, 2     |
| ② ポララミン注5mg + 生食50mL                                  | 0.5hr             | d1        |
| ③ ガザイバ点滴静注1000mg + 生食210mL                            | 12.5mL/hr→最大100mL | d1, 8, 15 |
| ④ グラニセトロン静注液3mg + 生食50mL                              | 0.5hr             | d1, 2     |
| ⑤ トリアキシシ点滴静注用 90mg/m <sup>2</sup> + 生食250mL (全量250mL) | 1.0hr             | d1, 2     |
| ⑥   |                   |           |
| ⑦   |                   |           |
| ⑧   |                   |           |
| ⑨   |                   |           |
| ⑩   |                   |           |
| ⑪   |                   |           |
| ⑫   |                   |           |
| ⑬   |                   |           |

コメント オビヌツズマブ投与60分から12時間前にPSL100mg内服、30分前にブルフェン2錠内服。強い嘔気が予想される時にはプロイメンド、アロキシ点滴も考慮。初回は12.5mL/hrの速度で点滴静注し、患者の状態を観察しながら30分毎に12.5mL/hrずつ増量し、最大で100mL/hr。