

# レジメン概要

レジメン名	G-Benda (2コース目以降)
適応症	濾胞性リンパ腫
診療科	血液内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ガザイバ	オビヌツズマブ	-	1000mg
トリアキシ	ベンダムスチン	-	100mg

## 投与方法詳細

1サイクル 28 日

- |  |                   |       |
|--|-------------------|-------|
| ① 生食100mL  | 血管確保+フラッシュ        | d1, 2 |
| ② ポララミン注5mg + 生食50mL                                 | 0.5hr             | d1    |
| ③ ガザイバ点滴静注1000mg + 生食210mL                           | 25mL/hr→最大100mL/h | d1    |
| ④ グラニセトロン静注液3mg + 生食50mL                             | 0.5hr             | d1, 2 |
| ⑤ トリアキシ点滴静注用 90mg/m <sup>2</sup> + 生食250mL (全量250mL) | 1.0hr             | d1, 2 |
| ⑥  |                   |       |
| ⑦  |                   |       |
| ⑧  |                   |       |
| ⑨  |                   |       |
| ⑩  |                   |       |
| ⑪  |                   |       |
| ⑫  |                   |       |
| ⑬  |                   |       |

コメント オビヌツズマブ投与60分から12時間前にPSL100mg内服、30分前にブルフェン2錠内服。強い嘔気が予想される時にはプロイメンド、アロキシ点滴も考慮。初回は25mL/hrの速度で点滴静注し、患者の状態を観察しながら30分毎に25mL/hrずつ増量し、最大で100mL/hr。