

レジメン概要

| | |
|-------|-----------|
| レジメン名 | R-THP-COP |
| 適応症 | 悪性リンパ腫 |
| 診療科 | 血液内科 |

| 使用薬 | 一般名 | 略称 | 当院採用規格 |
|--------|-----------|---------|--------------|
| リツキシマブ | リツキシマブ | Rmab | 100mg, 500mg |
| エンドキサン | シクロホスファミド | CPA | 500mg |
| ピノルビン | ピラルビシン | THP-ADM | 10mg, 20mg |
| オンコビン | ビンクリスチン | VCR | 1mg |

投与方法詳細

1サイクル 21 日

| | | |
|--|----------------|------|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1,2 |
| ② ソルコーテフ200mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ③ ポララミン5mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ④ リツキシマブ375mg/m ² +生食500mL | 25mL/h→100mL/h | d1 |
| ⑤ グラニセトロン3mg+生食50mL | 15分 | d2 |
| ⑥ ピノルビン50mg/m ² +5%ブドウ糖液100mL | 30分 | d2 |
| ⑦ オンコビン1.4mg/m ² +生食50mL | 15分 | d2 |
| ⑧ エンドキサン750mg/m ² +生食250mL | 2時間 | d2 |

- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬

コメント day2-6 : プレドニゾロン100mg/body 分2朝・夕 (糖尿病や高齢者などは適宜減量)