

レジメン概要

レジメン名	CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab (NEJ043)
適応症	非小細胞肺癌
診療科	呼吸器内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
テセントリク	アテゾリズマブ	-	1200mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|--|-------------|----|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② テセントリク1200mg+生食250mL | 1時間 | d1 |
| ③ アバスチン15mg/kg+生食100mL | 1時間30分 | d1 |
| ④ プロイメンド+生食50mL | 30分 | d1 |
| ⑤ 生食50mL | プロイメンドフラッシュ | d1 |
| ⑥ アロキシ+デキサート8.25mg+ガスター+生食50mL | 30分 | d1 |
| ⑦ パクリタキセル175mg/m ² +生食500mL | 3時間 | d1 |
| ⑧ カルボプラチンAUC6+5%ブドウ糖液250mL | 1時間 | d1 |
| ⑨ | | |
| ⑩ 【維持療法】 | | |
| ⑪ 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ⑫ テセントリク1200mg+生食250mL | 30分 | d1 |
| ⑬ アバスチン15mg/kg+生食100mL | 30分 | d1 |

コメント CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab後、Atezolizumab+BEVを3週ごとにPDになるまで継続。