

# レジメン概要

レジメン名	mFOLFOXIRI + Bev
適応症	大腸癌
診療科	腫瘍内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	40mg, 100mg
オキサリプラチン	オキサリプラチン	I-OHP	50mg, 100mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg

## 投与方法詳細

1サイクル 14 日

- |   |            |    |
|---|------------|----|
| ① 生食50mL                                    | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② プロイメンド+生食100mL                            | 30分        | d1 |
| ③ アロキシ+デキサート9.9mg+生食100mL                   | 30分        | d1 |
| ④ アバスチン5mg/kg+生食100mL                       | 90分        | d1 |
| ⑤ トポテシン150mg/m <sup>2</sup> +生食250mg        | 1時間        | d1 |
| ⑥ オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液250mL | 2時間        | d1 |
| ⑦ レボホリナート200mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液250mL | 2時間        | d1 |
| ⑧ 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液100mL  | 48時間       | d1 |

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

コメント