

レジメン概要

レジメン名	TCbH(DTX+CBDCA+HER) triweekly 2コース目以降
適応症	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌
診療科	乳腺外科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	20mg, 80mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
トラスツズマブ	トラスツズマブ	Tmab/HER	60mg, 150mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|--|------------|----|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② トラスツズマブ 6mg/kg (注射用水で溶解) + 生食250mL | 0.5hr | d1 |
| ③ 生食50mL | フラッシュ | d1 |
| ④ プロイメンド点滴静注用150mg + アロキシ静注0.75mg + デキサート9.9mg + 生食100mL | 0.5hr | d1 |
| ⑤ ドセタキセル75mg/m ² + 生食250mL | 1.0hr | d1 |
| ⑥ カルボプラチン6AUC + 生食250mL | 1.0hr | d1 |
| ⑦ | | |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール21日。レスタミン錠10mg 5錠をドセタキセル投与30分前に内服。