

レジメン概要

レジメン名	GD療法(GEM900+DTX70)
適応症	悪性骨軟部肉腫
診療科	整形外科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	200mg, 1g
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	20mg, 80mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

① ソルデム3A 500mL(17:00-1:00)	8.0hr	d0, 1, 2, 7-9
② 生食50mL	血管確保+フラッシュ	d1, 8
③ グラニセトロン3mg + デキサート9.9mg + 生食100mL	0.5hr	d1, 8
④ ゲムシタビン900mg/m ² + 生食100mL	0.5hr	d1, 8
⑤ ドセタキセル70mg/m ² + 生食250mL	1.0hr	d8
⑥ デキサート9.9mg + 生食50mL(10:30~10:45)	0.25hr	d7, d9
⑦ デキサート9.9mg + 生食50mL(20:00~20:15)	0.25hr	d7, d8, d9
⑧ ソルデム3A 500mL(1:00-9:00)	8.0hr	d1, 2, 8, 9, 10
⑨ ソルデム3A 500mL(9:00-17:00)	8.0hr	d1, 2, 7, 8, 9, 10
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		

コメント 1クール21日。術前・術後化学療法の場合は各3コース。