

# レジメン概要

レジメン名	Atezolizumab+CDDP+PEM
適応症	非小細胞肺癌
診療科	呼吸器内科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
テセントリク	アテゾリズマブ	-	1200mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	100mg, 500mg

## 投与方法詳細

1サイクル 21 日

- |   |            |
|---|------------|
| ① 生食50mL                                    | 血管確保+フラッシュ |
| ② テセントリク1200mg+生食250mL                      | 1時間        |
| ③ プロイメンド+アロキシ+デキサート3.3mg+生食100mL            | 30分        |
| ④ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5%ブドウ糖液500mL | 2時間        |
| ⑤ アリムタ500mg/m <sup>2</sup> +生食100mL         | 10分        |
| ⑥ 20%マンニトール                                 | 45分        |
| ⑦ シスプラチン75mg/m <sup>2</sup> +生食300mL        | 1時間        |
| ⑧ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラK10mEq+5%ブドウ糖液500mL | 2時間        |
| ⑨   |            |
| ⑩   |            |
| ⑪   |            |
| ⑫   |            |
| ⑬   |            |

コメント 最大4サイクル、その後PDになるまでAtezolizumab+PEM  
day0,2-4:DEX8mg内服 day5:DEX4mg内服  
day2-5:体重1.5kg~2kg増加の時ラシックス20mg内服、2kgを超える時ラシックス40mg内服