

レジメン概要

| | |
|-------|---------------------------------|
| レジメン名 | A+AVD (Brentuximab Vedotin+AVD) |
| 適応症 | ホジキンリンパ腫 |
| 診療科 | 血液内科 |

| 使用薬 | 一般名 | 略称 | 当院採用規格 |
|----------|---------------|------|------------|
| アドセトリス | ブレンツキシマブ ベドチン | - | 50mg |
| ドキシソルビシン | ドキシソルビシン | DXR | 10mg, 50mg |
| エクザール | ビンブラスチン | VBL | 10mg |
| ダカルバジン | ダカルバジン | DTIC | 100mg |

投与方法詳細

1サイクル 28 日

- | | | |
|--|------------|-------|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1,15 |
| ② ポララミン+生食50mL | 15分 | d1,15 |
| ③ 生食50mL | アドセトリス前後フラ | d1,15 |
| ④ アドセトリス1.2mg/kg+注射用水+生食100mL | 30分 | d1,15 |
| ⑤ グラニセトロン+プロイメンド+生食100mL | 30分 | d1,15 |
| ⑥ 生食100mL | 30分 | d1,15 |
| ⑦ ドキシソルビシン25mg/m ² +生食100mL | 30分 | d1,15 |
| ⑧ エクザール6mg/m ² +生食100mL | 15分 | d1,15 |
| ⑨ ダカルバジン375mg/m ² +注射用水+5%ブドウ糖 500mL | 2時間 | d1,15 |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント アドセトリス前後生食フラッシュ、最終濃度0.4~1.2mg/mLとする。