

レジメン概要

レジメン名 RCHOP (PSL p.o.)

適応症 悪性リンパ腫

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
リツキシマブ	リツキシマブ	Rmab	100mg, 500mg
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	10mg, 50mg
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1mg
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|--|------------|----|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② ソル・コーテフ100mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ③ ポララミン5mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ④ リツキシマブ375mg/m ² +生食500mL (1mg/mL) | 50→200mL/時 | d1 |
| ⑤ グラニセトロン3mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ⑥ ドキシソルビシン50mg/m ² +生食100mL | 30分 | d1 |
| ⑦ オンコビン1.4mg/m ² (max : 2mg/body) +生食50mL | 15分 | d1 |
| ⑧ エンドキサン750mg/m ² +生食250mL | 2時間 | d1 |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール21日 PSL100mg/日 d1-5に内服