

レジメン概要

レジメン名 FOLFIRINOX

適応症 膵がん

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
オキサリプラチン	オキサリプラチン	I-OHP	50mg, 100mg
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	40mg, 100mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg

投与方法詳細

1サイクル 14日

- | | | |
|--|------------|----|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② プロイメンド150mg+生食100mL | 30分 | d1 |
| ③ アロキシ0.75mg+デキサート4.95mg+生食100mL | 30分 | d1 |
| ④ オキサリプラチン85mg/m ² +5%ブドウ糖250mL | 2時間 | d1 |
| ⑤ レボホリナート200mg/m ² +5%ブドウ糖250mL | 2時間 | d1 |
| ⑥ イリノテカン180mg/m ² +生食250mL | 1時間30分 | d1 |
| ⑦ フルオロウラシル400mg/m ² +生食50mL | 5分 | d1 |
| ⑧ フルオロウラシル2400mg/m ² +生食100mL (トレフューザー使用) | 46時間 | d1 |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール14日 d2-3 デキサメタゾン4mg 1日1回内服