

# レジメン概要

レジメン名 mFOLFOX6 + BEV(5mg/kg)

適応症 大腸がん

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg
オキサリプラチン	オキサリプラチン	I-OHP	50mg, 100mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg

## 投与法詳細

1サイクル 14 日

- |  |            |    |
|--|------------|----|
| ① 生食100mL  | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② グラニセトロン3mg+デキサート6.6mg+生食100mL                              | 30分        | d1 |
| ③ アバスチン5mg/kg+生食100mL  | 1時間30分     | d1 |
| ④ 生食50mL   | フラッシュ      | d1 |
| ⑤ レボホリナート200mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖250mL                   | 2時間        | d1 |
| ⑥ オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖250mL                   | 2時間        | d1 |
| ⑦ フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖500mL                  | 5分         | d1 |
| ⑧ フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖100mL<br>(トレフェューザー使用) | 46時間       | d1 |

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

コメント 1クール14日 BEV投与は初回90分、2回目60分、以降30分に短縮可