

レジメン概要

レジメン名 FOLFIRI + Panitumumab

適応症 大腸がん

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ベクティビックス	パニツムマブ	Pmab	100mg, 400mg
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	40mg, 100mg
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	250mg, 1000mg

投与法詳細

1サイクル 14 日

- | | | |
|--|------------|----|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② アロキシ0.75mg+デキサート3.3mg+生食100mL | 30分 | d1 |
| ③ ベクティビックス6mg/kg+生食100mL | 1時間 | d1 |
| ④ 生食50mL | フラッシュ | d1 |
| ⑤ レボホリナート200mg/m ² +生食250mL | 2時間 | d1 |
| ⑥ イリノテカン150mg/m ² +生食250mL | 1時間30分 | d1 |
| ⑦ フルオロウラシル400mg/m ² +生食50mL | 5分 | d1 |
| ⑧ フルオロウラシル2400mg/m ² +生食100mL (トレフューザー使用) | 46時間 | d1 |

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

コメント 1クール14日