

レジメン概要

レジメン名 CBDCA+PTX+BEV (NSCLC)

適応症 非小細胞肺癌

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg

投与方法詳細

1サイクル 21 日

- | | | |
|---|------------|----|
| ① 生食50mL | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② プロイメンド150mg+デキサート3.3mg+グラニセト口 30分
ン3mg+生食100mL | | d1 |
| ③ 生食50mL | フラッシュ | d1 |
| ④ ファモチジン20mg+生食50mL | 10分 | d1 |
| ⑤ パクリタキセル200mg/m ² +生食500mL | 3時間 | d1 |
| ⑥ カルボプラチン (AUC6) +5%ブドウ糖250mL | 1時間 | d1 |
| ⑦ アバスチン15mg/kg+生食100mL | 1時間30分 | |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール21日 非扁平上皮癌 治療開始時にレスタミン5錠内服
BEV投与は初回90分、2回目60分、以降30分に短縮可