

レジメン概要

レジメン名 R-CEPP (ETP p.o.)

適応症 悪性リンパ腫

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
リツキシマブ	リツキシマブ	Rmab	100mg, 500mg
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500mg

投与方法詳細

1サイクル 28 日

- | | | |
|--|------------|------|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1,8 |
| ② ソル・コーテフ100mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ③ ポララミン5mg+生食50mL | 15分 | d1 |
| ④ リツキシマブ375mg/m ² +生食500mL (1mg/mL) | 50→200mL/時 | d1 |
| ⑤ グラニセトロン3mg+生食50mL | 15分 | d1,8 |
| ⑥ エンドキサン600mg/m ² +生食250mL | 1時間 | d1,8 |
| ⑦ | | |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール28日 塩酸プロカルバジン : 60mg/m²/日 1日1回就寝前 d 1-10、PSL : 60mg/m²/日 1日2回朝・昼食後に分服 d 1-10、エトポシド : 70-140mg/m²/日 1日1回朝食後 d 1-3