

レジメン概要

レジメン名 ABVD

適応症 ホジキンリンパ腫

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	10mg, 50mg
ブレオ	ブレオマイシン	BLM	5mg
エクザール	ビンブラスチン	VBL	10mg
ダカルバジン	ダカルバジン	DTIC	100mg

投与法詳細

1サイクル 28 日

- | | | |
|---|------------|-------|
| ① 生食100mL | 血管確保+フラッシュ | d1,15 |
| ② グラニセトロン3mg+生食50mL | 15分 | d1,15 |
| ③ ドキシソルビシン25mg/m ² +生食100mL | 30分 | d1,15 |
| ④ デキサート6.6mg/2mL+生食50mL | 15分 | d1,15 |
| ⑤ ブレオ10mg/m ² (max : 15mg/body) +生食50mL | 15分 | d1,15 |
| ⑥ エクザール6mg/m ² (max : 10mg/body) +生食50mL | 15分 | d1,15 |
| ⑦ ダカルバジン375mg/m ² +5%ブドウ糖500mL | 2時間 | d1,15 |
| ⑧ | | |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |
| ⑬ | | |

コメント 1クール28日