

# レジメン概要

レジメン名 CDDP+PEM+BEV

適応症 非小細胞肺癌

診療科

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	100mg, 500mg
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	10mg, 25mg, 50mg
アバスチン	ベバシズマブ	BEV	100mg, 400mg

## 投与法詳細

1サイクル 21 日

- |   |            |    |
|---|------------|----|
| ① 生食50mL                                      | 血管確保+フラッシュ | d1 |
| ② アロキシ0.75mg+プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食100mL   | 30分        | d1 |
| ③ 生食50mL                                      | フラッシュ      | d1 |
| ④ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラカリウム10mEq+5%ブドウ糖500mL | 2時間        | d1 |
| ⑤ アリムタ500mg/m <sup>2</sup> +生食100mL           | 10分        | d1 |
| ⑥ 20%マンニトール300mL                              | 45分        | d1 |
| ⑦ シスプラチン75mg/m <sup>2</sup> +生食500mL          | 1時間        | d1 |
| ⑧ 生食500mL+硫酸Mg20mEq+アスパラカリウム10mEq+5%ブドウ糖500mL | 2時間        | d1 |
| ⑨ アバスチン7.5mg/kg+生食100mL                       | 1時間30分     | d1 |
| ⑩   |            |    |
| ⑪   |            |    |
| ⑫   |            |    |
| ⑬   |            |    |

コメント 1クール21日 day0,2にデカドロン錠8mg内服 パンビタン1g連日内服 メチコバル1mg9週ごと筋肉注射  
BEV投与は初回90分、2回目60分、以降30分に短縮可