



レジメン概要

2022年4月7日

9:11:43

レジメン名	Nivolumab+Ipilimumab+CBD CA+PTX	通し番号	0377
適応症	扁平上皮非小細胞肺癌	受付日	2020/12/08
診療科	呼吸器内科	受付番号	2020-呼内-10

使用薬	一般名	略称	当院採用規格
オブジーボ	ニボルマブ	Nivo	100mg, 20mg
ヤーボイ	イピリムマブ	Ipi	50mg
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	50mg, 150mg, 450mg
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	30mg, 100mg

投与方法詳細

1サイクル 42 日

① 生食100mL	血管確保+フラッシュ	d1, d22
② オブジーボ360mg/body + 生食100mL (全量100mL に調製)	0.5hr	d1, d22
③ 生食50mL	0.5hr	d1
④ ヤーボイ1mg/kg + 生食50mL (≥50kg…全量50mL, <50kg…全量25mL)	0.5hr	d1
⑤ プロイメンド150mg + 生食100mL	0.5hr	d1, d22
⑥ 生食50mL	フラッシュ	d1, d22
⑦ アロキシ0.75mg + デキサート9.9mg + ガスター 20mg + 生食50mL	10min	d1, d22
⑧ パクリタキセル200mg/m ² + 生食500mL	3.0hr	d1, d22
⑨ カルボプラチン6AUC + 5%ブドウ糖250mL	1.0hr	d1, d22
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

コメント 1クール42日（化学療法2クール分）。終了後、Nivo+Ipi維持療法。PTX
投与30分前にレスタミン5錠内服。