


大崎市のがん罹患

令和2(2020)年集計

罹患数



2020年に大崎市で新たにがんと診断された件数

男性 692 件

女性 543 件

男性は女性よりも多く、全体の約6割を占めていました。部位別では、男性では、大腸、胃、肺、前立腺、膀胱の順に多く、女性では、大腸、乳房、胃、子宮、肺の順に多くなっていました。

※上皮内がんを含む（以下、図表のすべてで同じ）

部位別にみた罹患の多い順

	1	2	3	4	5
男性	大腸	胃	肺	前立腺	膀胱
女性	大腸	乳房	胃	子宮	肺

出典

がん登録等の推進に関する法律 第19条に基づき、宮城県立がんセンターが申請し、提供を受け集計したもの。

大崎市のがん罹患 令和6年7月

編集・発行：宮城県立がんセンター

連絡先：〒981-1239

宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1


TEL：022-796-3624

E-mail：registry@miyagi-pho.jp

推移


●男性では、2020年に減少に転じ、女性では、2020年に増加に転じました。

推計人口…国勢調査による人口を基に住民基本台帳から得た人口の増減を加減して算出した人口です。



●男性では、全国や宮城県よりも高い値で推移しています。女性では、全国や宮城県よりも高い値でしたが、その後減少し、2020年では全国より高く、宮城県よりも低い値でした。

年齢調整罹患率で比較する理由…がんは高齢者に多いため、単純に人口で割った罹患率で比較した場合、高齢化率の高い地域で高い値になります。そのため、がんについて地域比較を行うときは、同じ年齢構成のモデル人口に置き換えた年齢調整罹患率を計算して比較します。




がんの部位別罹患数


がんの部位別罹患数（2020年）

部位	ICD-10	男		女	
		罹患数	%	罹患数	%
口腔・咽頭	C00-C14	22	3.2	7	1.3
食道	C15 D001	24	3.5	3	0.6
胃	C16	117	16.9	58	10.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20 D010-D012	132	19.1	119	21.9
肝・肝内胆管	C22	29	4.2	18	3.3
胆のう・胆管	C23-C24	12	1.7	12	2.2
膵臓	C25	22	3.2	31	5.7
喉頭	C32	4	0.6	0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	107	15.5	42	7.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	19	2.7	20	3.7
乳房	C50 D05	0	0.0	81	14.9
子宮	C53-C55 D06	-	-	51	9.4
卵巣	C56	-	-	20	3.7
前立腺	C61	87	12.6	-	-
膀胱	C67 D090	31	4.5	18	3.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66, C68	21	3.0	13	2.4
脳・中枢神経系	C70-C72	5	0.7	2	0.4
甲状腺	C73	4	0.6	6	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85, C96	20	2.9	13	2.4
多発性骨髄腫	C88, C90	4	0.6	0	0.0
白血病	C91-C95	4	0.6	8	1.5
その他	上記以外	28	4.0	21	3.9
全部位		692	100	543	100

がんの発生割合（2020年 男）



がんの発生割合（2020年 女）



男性

●男性に多いがんは、多い順に大腸、胃、肺、前立腺の4 つで、男性全体の6 割以上を占めました。

女性

●女性に多いがんは、多い順に大腸、乳房、胃、子宮、肺の5 つで、女性全体の6 割以上を占めました。

全国・宮城県との比較

●男性では、全国や宮城県と比べて、大腸、肺、胃、肝・肝内胆管、膵臓の割合が高く、前立腺、膀胱、膵臓の割合が低くなっていました。

●女性では、全国や宮城県と比べて、大腸、胃、膵臓の割合が高く、乳房、子宮、悪性リンパ腫の割合が低くなっていました。

年齢階級別罹患数

2020年	男性	0-14歳	15-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
口腔・咽頭	22	0	0	2	1	2	5	7	5
食道	24	0	0	0	0	0	8	10	6
胃	117	0	0	1	3	8	29	39	37
大腸（結腸・直腸）	132	0	0	1	3	18	38	41	31
肝・肝内胆管	29	0	0	1	0	1	3	13	11
胆のう・胆管	12	0	0	0	0	0	4	4	4
膵臓	22	0	0	1	0	2	6	8	5
喉頭	4	0	0	0	1	0	1	0	2
肺	107	0	0	0	0	11	23	40	33
皮膚	19	0	0	1	1	0	4	6	7
乳房	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮（頸部・体部）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	87	0	0	0	0	7	23	28	29
膀胱	31	0	0	0	1	1	8	10	11
腎・尿路（膀胱除く）	21	0	0	0	1	2	5	8	5
脳・中枢神経系	5	0	0	1	1	0	0	2	1
甲状腺	4	0	0	0	1	1	1	0	1
悪性リンパ腫	20	0	1	2	0	2	3	2	10
多発性骨髄腫	4	0	0	0	0	0	2	1	1
白血病	4	1	0	0	0	1	2	0	0
その他	28	0	0	2	0	8	3	11	4
	692	1	1	12	13	64	168	230	203

多

少


2020年	女性	0-14歳	15-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
口腔・咽頭	7	0	0	0	0	2	2	1	2
食道	3	0	0	0	0	0	3	0	0
胃	58	0	0	1	1	2	7	14	33
大腸（結腸・直腸）	119	0	0	1	4	11	21	32	50
肝・肝内胆管	18	0	0	0	0	0	1	1	16
胆のう・胆管	12	0	0	0	0	0	2	1	9
膵臓	31	0	0	0	0	1	10	7	13
喉頭	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺	42	0	0	0	0	2	10	16	14
皮膚	20	0	1	0	1	1	3	2	12
乳房	81	0	0	2	12	13	23	16	15
子宮（頸部・体部）	51	0	5	8	13	9	6	4	6
卵巣	20	0	1	0	1	8	3	3	4
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	18	0	0	0	1	1	0	8	8
腎・尿路（膀胱除く）	13	0	0	1	0	0	1	3	8
脳・中枢神経系	2	0	0	0	0	0	0	1	1
甲状腺	6	0	0	0	1	0	0	3	2
悪性リンパ腫	13	0	0	0	0	2	2	6	3
多発性骨髄腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血病	8	0	0	0	1	3	0	2	2
その他	21	2	0	1	1	4	2	3	8
	543	2	7	14	36	59	96	123	206

多

少

年齢階級別罹患率


— 男性 — 女性




がんの検診発見割合

●すべての部位で、がん検診等（健康診断・人間ドックを含む）で発見された割合が全国や宮城県よりも低くなっていました。男女別では、胃、大腸、肺で男性で高い値でした。


がんの検診発見割合（2020年）




がんの検診発見割合（男女別）



発見経緯別割合（男性）




発見経緯別割合（女性）



進展度

がんが発見されたときの進み具合（2020年 男）



上皮内・限局	不明	浸潤・転移
59.1	0.0	40.9
58.3	4.2	37.5
71.6	4.3	24.1
64.4	3.8	31.8
51.7	24.1	24.1
8.3	33.3	58.3
9.1	9.1	81.8
50.0	0.0	50.0
25.0	13.5	61.5
89.5	0.0	10.5
0.0	0.0	0.0


男性

●口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝・肝内胆管、喉頭、皮膚、前立腺、膀胱、腎・尿路で、早期のがんが多くなっていました。一方、胆のう・胆管、膵臓、肺では、進んだ状態のがんが多くなっていました。

女性

●胃、大腸、皮膚、乳房、子宮、膀胱で、早期のがんが多くなっていました。一方、口腔・咽頭、食道、膵臓、甲状腺、悪性リンパ腫では、進んだ状態のがんが多くなっていました。







がんが発見されたときの進み具合（2020年 女）



上皮内・限局	不明	浸潤・転移
28.6	0.0	71.4
0.0	0.0	100.0
60.3	10.3	29.3
61.5	4.3	34.2
33.3	50.0	16.7
36.4	18.2	45.5
16.1	9.7	74.2
0.0	0.0	0.0
47.6	14.3	38.1
80.0	0.0	20.0
66.7	4.9	28.4
80.4	3.9	15.7
45.0	5.0	50.0
70.6	5.9	23.5
46.2	23.1	30.8
50.0	50.0	0.0
0.0	0.0	100.0
0.0	7.7	92.3

進展度…がんが発見されたときの進み具合のことです。病院では「ステージ」が使われますが、進展度は、これをもう少しわかりやすくしたものです。進展度が上皮内または限局のときは、がんが臓器の表面や臓器内に限局している状態で、比較的早期の状態です。一方、浸潤・転移のときは比較的進んだ状態になります。

がんの発見経緯と進展度



●がん検診は、がんの早期発見を目的に実施されています。男性の胃、大腸、女性の胃、大腸、肺、乳房では、がん検診等で発見された方は、他と比べて早期に発見された方の割合が高くなっていました。

